

Avertissements agricoles



Bulletin technique n° 29 du 28 août 1985

TOURNESOL : * SCLEROTINIA : Des dégâts locaux
POIREAU : TEIGNE : Le vol de 3ème génération se poursuit
MILDIOU DU TABAC : Attaque localisée

TOURNESOL

SCLEROTINIA : Des dégâts locaux

Des dégâts locaux dus au Sclerotinia peuvent être observés :

Les tiges attaquées sont brunes jaunâtres, extrêmement cassantes. Toute la partie charnue a été détruite réduisant la tige à un faisceau de fibres. Des sclérotés noirs se répandent sur le sol.

Le degré actuel du développement de la maladie rend inutile toute intervention.



Attention les symptômes de sclérotinia peuvent être confondus avec une attaque de Phomopsis.

Si la présence de sclérotinia est notée, il est nécessaire de ne pas réimplanter des cultures sensibles (colza - tournesol - légumineuses) sur les parcelles atteintes.

POIREAU

TEIGNE: Le vol de 3ème génération se poursuit

Continuez la protection avec un deuxième traitement dès réception.

Imprimerie de la Station de Strasbourg

Directeur-Gérant D. CALLU

Publication Périodique :

CPPAP N° : 1848 AD.

Abonnement annuel : 110,- F.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative

67084 STRASBOURG CEDEX

Alsace : (88) 37.32.18. - 69.65.89.

Haut-Rhin (89) 41.11.68.



7187

MILDIOU DU TABAC : Attaque localisée

Les Services Agronomiques des Tabacs de la SEITA, signalent la première attaque de mildiou du tabac (*Peronospora Tabacina*) constatée le 23 août 1985 sur une parcelle de variété VIRGIN D à KERTZFELD.

Les mesures suivantes ont été prises :

- récolte immédiate de la partie de pièce atteinte, avec destruction des feuilles malades,
- traitement fongicide immédiat des parcelles des variétés sensibles VIRGINIE et BURLEY sur l'ensemble de la commune.

Planteurs : Surveillez vos parcelles et prenez les mesures identiques, s'il y a lieu.

A préciser que la lutte contre le mildiou du tabac est rendue obligatoire par arrêté préfectoral (20 février 1984).

